

令和6年5月9日

会員各位

一般社団法人沼津薬剤師会

会長 板井和広

職能対策委員会

沼津市立病院点眼指導連携における

リンデロン点眼・点耳・点鼻液 0.1%の出荷調整に伴う対応について

拝啓、若葉の候、会員皆様方にはご健勝のこととお慶び申し上げます。

さて、この度様々な医薬品が出荷調整となり、沼津市立病院の白内障の手術後に使用する「リンデロン点眼・点耳・点鼻液 0.1%」もその一つであり、ここ最近沼津市立病院へ入荷ができないという問い合わせが増えてきています。外来で交付している説明書とリンデロン点眼・点耳・点鼻液 0.1%の後発医薬品の蓋の色が各メーカーによって違うことから後発医薬品への変更調剤を不可としていましたが、下記の条件に限り変更調剤を可能とする旨の連絡がありました。

- ・出荷調整のためリンデロン点眼・点耳・点鼻液 0.1%がどうしても入荷出来ない場合
- ・患者説明書の書き換え（リンデロンから変更した後発医薬品の名称と蓋の色の記載）
※別紙記載例参照
- ・変更時はその場で疑義照会はせずに疑義照会票にて事後報告（FAX コーナーへ FAX）

なお、処方箋の変更不可はそのままとのことです。

医薬品の品薄が続く中、大変恐縮ですが、ご対応いただきますようお願ひいたします。

敬具

別紙記載例（リンデロン点眼点耳点鼻 0.1%→サンベタゾン点眼点耳点鼻 0.1%）

白内障手術後のお薬				
眼 に点眼してください				
	あさ	ひる	ゆう	ねる前
（緑） サンベタゾン	炎症を 抑えます	（緑）	（緑）	（緑）
（ピンク） レホ・フロキサシン	感染症を 予防します	（紫）	（紫）	（紫）
（黄） ネバナック	痛みを 抑えます	よく振る	よく振る	よく振る
アセトアミノフェン	痛みを 抑えます	痛いとき		

★目薬の間隔は4~5分あけるとより効果的です。
★手術のあと、約1ヵ月間 毎日点眼するようにしてください。
(お薬が足りなくなりそうになったら、眼科外来でお薬を出してもらいましょう。)