

静 県 薬 第 596 号  
令 和 4 年 12 月 1 日

各地域薬剤師会会长 様

公益社団法人静岡県薬剤師会  
会長 石 川 幸 伸

「ゾコーバ<sup>®</sup>錠 125mg」の調剤に関する注意喚起について

標題の件について、日本薬剤師会から別添写（令和4年11月25日付け日薬業発第137号）のとおり通知がありました。

つきましては、本剤の調剤・備蓄等に関与する貴会会員へのご周知方よろしくお願い申し上げます。

担当：静岡県薬剤師会事務局業務スタッフ；橋本  
電話：054-203-2023／FAX：054-203-2028  
E-mail：hashimoto@shizuyaku.or.jp



日 薬 情 発 第 137 号  
令和 4 年 11 月 25 日

都道府県薬剤師会担当役員殿

日本薬剤師会  
担当副会長 川上 純一

### 「ゾコーバ®錠 125mg」の調剤に関する注意喚起について

平素より、本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、「ゾコーバ®錠 125mg」(有効成分:エンシトレルビル フマル酸)は、新型コロナウイルス感染症(SARS-CoV-2による感染症)の治療薬として令和4年11月22日に緊急承認されたところです。

国からの通知を含め、ゾコーバ®錠の使用に関しては、「新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(ゾコーバ錠 125mg)の医療機関及び薬局への配分について」(令和4年11月24日付け日薬業発第316号)としても通知しておりますが、本剤の調剤に際しては、下記の点にご留意いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。

会務ご多用のところ恐縮ながら、本剤の調剤・備蓄等に関する貴会会員にご周知下さいますようお願い申し上げます。

#### 記

- 上記通知に含まれる厚生労働省の通知や、添付文書等の記載事項を十分考慮すること。また、特に以下の点に留意すること。
  - 併用禁忌及び併用注意の薬剤が多数あることから、調剤時には、患者本人への聞き取りのほか、必要に応じ、当該患者のかかりつけ薬剤師・薬局や過去に利用した薬局等と連携するなどし、服薬中のすべての薬剤を確認するよう十分に注意すること。また、本剤で治療中に新たに他の薬剤を服用する場合、事前に相談するよう患者に指導すること。
  - 腎機能又は肝機能障害のある患者で、コルヒチンを投与中の患者には、投与しないこと。
  - 重度の肝機能障害患者(コルヒチンを投与中の患者を除く)への投与



されない。

- 妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、投与しないこと。
- 妊娠可能な女性に対しては、本剤投与中及び最終投与後一定期間は適切な避妊を行うよう指導すること。
- SARS-CoV-2 による感染症の症状が発現してから速やかに投与を開始すること。
- 通常、12歳以上のお子様及び成人にはエンシトリルビルとして1日目は375mg（ゾコーバ<sup>®</sup>錠 3錠）を、2日目から5日目は125mg（ゾコーバ<sup>®</sup>錠 1錠）を1日1回経口投与する。
- 12歳未満のお子様については対象とされていない。

以上